



Konya Şeker'den Çevreci Gübre: Biovin ve Biovin Plus

Bitkisel kökenli sıvı organik maddeler insan sağlığı ve çevre kalitesinin korunması, tarımın gelişimi ve sağlıklı tohum yetişmesi için en uygun ortamı sağlıyor. Konya Şeker'in tarımcılık için geliştirdiği en yeni inovatif ürünü olan bitkisel kökenli sıvı organik gübre Biovin ve Biovin Plus, tarım kaynaklarının korunması ve sağlıklı tohum gelişimi için önemli. Biovin ve Biovin Plus, sürdürülebilir bir tarımcılık için ekimi yapılan tohumların gelişimi ve topraktan uzun vadede verim almayı sağlıyor.

Bitkisel kökenli sıvı organik madde olan Biovin ve Biovin Plus, yoğunlaştırılmış bitki özlerinden oluşan kıvamlı ve sıvı, bir bitki özü. Bitki öz sularının yoğunlaştırılmış çözültisi olduğundan azot, fosfor, potasyum, demir ve çinko gibi elementleri bünyesinde barındırıyor. Bu sayede su ve havanın uzun süre toprağın içinde kalmasını sağlıyor. Biovin ve Biovin Plus muadili ürünlere göre hem kalitesi hem de fiyat avantajı ile öne çıkıyor.

Biovin ve Biovin Plus, bitkisel menşeli sıvı organik gübre olduğu için tarlada kalan anızın kısa sürede bozulmasını ve hafif topraklarda suyun tutulmasını ve nemli kalmasını sağlıyor. Ekim dikiminden önce tabana verilebiliyor ve her türlü sulama sisteminde (yağmurlama, damlama sulama vb.) gerekli miktarda sisteme enjekte edilebiliyor.

Biovin ve Biovin Plus'ın kullanıldığı ekim alanlarındaki uygulama şekli.

Ürün	Biovin Dozları	Uygulama Zamanı ve Şekli
Yaprakları yenen sebzeler	1-2,5 kg/dekar	İlk suyu ile beraber verilir. Hasada göre bitki durumuna kadar devam edilir. 3-4 uygulama yapılabilir.
Domates, Patlıcan, Biber, Kabak, Hıyar, Kavun, Karpuz	2-4 kg/dekar	İlk suyu ile beraber verilir. Hasada göre bitki durumuna kadar devam edilir. 4-5 uygulama yapılabilir.
Meyve Ağaçları	4-6 kg/dekar	ilk suyu ile beraber verilir. Hasada kadar bitki durumuna göre 10-15 günde uygulama yapılır. Ağaç başına 300-500gr. Uygulanır.
Tahıllar	2-4kg./dekar	Her sulama ile verilebilir. 4-5 uygulama yapılabilir. Her uygulamadan sonra 15-20 dk. temiz su verilmelidir.
Şeker Pancarı, Patates, Mısır, Ayçiçeği, Turp, Soğan, Havuç, Kanola, Yer Fıstığı, Susam, Tütün ve Pamuk	1-3 kg./dekar	Her sulama ile verilebilir. 4-5 uygulama yapılabilir. Her uygulamadan sonra 15-20 dk. temiz su verilmelidir.

Çilek	1-2,5 kg/dekar	Yeşil akşam oluştuktan sonra 10-15 gün aralıklarla sulama suyu ile topraktan verilmelidir.
Bağ	2kg/dekar	Yetiştirme dönemi boyunca verilebilir. Koruk döneminde dozaj arttırılarak devam edilir.